



MERISTEM

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

Каталог специальных продуктов
для открытого и закрытого грунта





БИОСТИМУЛЯТОРЫ СТИМАКС

Стимакс для семян
Стимакс Старт
Стимакс Рост
Стимакс Урожай
Стимакс Плюс
Стимакс Универсал
Стимакс Колор



ВОДОРАСТВОРIMЫЕ МИКРОУДОБРЕНИЯ для ЛИСТОВЫХ ПОДКОРМОК МЕРИСТЕМ МАКС

Меристем Макс 18-18-18
Меристем Макс 19-19-19
Меристем Макс 0-21-34
Меристем Макс 0-43-38



АНТИСТРЕССАНТЫ АМИНОМАКС

Аминомакс 10
Аминомакс 30
Аминомакс Органик
Аминомакс Овощной
Аминомакс Кальций
Аминомакс Содам



ВОДОРАСТВОРIMЫЕ МИКРОУДОБРЕНИЯ для КАПЕЛЬНЫХ СИСТЕМ МЕРИСТЕМ ДРИП

Меристем Дрип Фаст Райпенинг
Меристем Дрип Весна
Меристем Дрип Кристофоз
Меристем Дрип Нитромакс



КОРРЕКТОРЫ ДЕФИЦИТА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ МЕРИСТЕМ

Меристем K
Меристем B
Меристем Ca
Меристем Ca-B
Меристем B-Mo
Меристем Микс



ПОЛИФЛАВОНОИДЫ ИСТАРКА

Истарка Fe
Истарка Zn
Истарка Mg
Истарка Mn
Истарка Ca
Истарка Zn-Mn
Истарка Микс



КОРРЕКТОРЫ ДЕФИЦИТА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ МЕРИСТЕМ МИКРО

Меристем микро Fe
Меристем микро Zn
Меристем микро Mn
Меристем микро Mg
Меристем микро B-Mo
Меристем микро B
Меристем микро Микс



ФОСФИТЫ КАФОМ

Кафом K
Кафом Mg
Кафом Ca
Кафом Cu
Кафом Zn



ПРОДУКТЫ УЛУЧШЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПОЧВЫ МАДРАМ

Мадрам Ca
Мадрам Гумус
Мадрам Био

О НАС



MERISTEM

Производитель высококачественных продуктов питания в Валенсии, Испания



NUTRITECH SYSTEM

Эксклюзивный дистрибутор компании MERISTEM

Компания «MERISTEM», основанная более 30 лет назад, была создана для разработки и производства специальных удобрений для интенсивного питания растений.

С тех пор компания «Meristem» стремится найти инновационные решения для постоянно развивающегося сельскохозяйственного рынка, который сегодня требует высокотехнологичных и экологически чистых продуктов.

Качество, экологичность, инновации, гибкость, сервисная поддержка клиентов, честность и ответственность являются нашими корпоративными ценностями, которых мы придерживаемся в повседневной деятельности по развитию стратегии компании.

Компания «Nutritech System» уже более 20 лет является участником на рынке специальных удобрений в странах бывшего СССР и Восточной Европы. Предлагает широкий диапазон современных удобрений, обеспечивающих эффективное и сбалансированное питание растений.

Применение наших продуктов позволяет существенно повысить урожайность и получить качественную и экологически чистую продукцию.

Биостимуляторы STIMAX (СТИМАКС)

Биостимуляторы СТИМАКС, основанные на экстракте морских водорослей «*Ascophyllum nodosum*», содержат свободные аминокислоты и полисахариды, а также сбалансированный набор макро- и микроэлементов. Применяются для регуляции и стимуляции необходимых физиологических процессов в растении.



Stimax Seeds (Стимакс для семян)

БИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН



СТИМАКС ДЛЯ СЕМЯН представляет собой полноценный биостимулирующий состав, специально разработанный для обработки семян различных сельскохозяйственных культур. Ускоряет всхожесть и стимулирует развитие корневой системы. Позволяет получить более ранние и дружные всходы.

Состав

| | |
|---|------|
| Свободные аминокислоты | 6% |
| Экстракт водорослей Ascophyllum nodosum | 2% |
| Общий азот (N) | 7,5% |
| Органический азот (N) | 2,5% |
| Мочевинный азот(N) | 5% |
| Водорастворимый фосфор (P2O5) | 5% |
| Водорастворимый калий (K2O) | 5,4% |
| Бор (B) | 0,1% |
| Железо (Fe) | 0,3% |
| Железо (Fe), хелат DTPA | 0,3% |
| Цинк (Zn) | 0,5% |
| Цинк (Zn), хелат EDTA | 0,5% |
| pH (1% раствора) | 5,7 |

Применение

- Обработка семян зерновых: 0,5-0,75 л/т семян.
- Обработка семян технических, зернобобовых культур (подсолнечник, кукуруза): 2-6 л/т семян.
- Обработка клубней картофеля: 0,5-1 л/т семян.



Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л



Stimax Start (Стимакс Старт)

БИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

СТИМАКС СТАРТ — особый вид биостимуляторов, предназначенный для развития мощной корневой системы. Стимулирует быстрое развитие и энергичный рост растения, количество и качество всего урожая.



Состав

| | |
|---|------|
| Экстракт водорослей Ascophyllum nodosum | 12% |
| Общий азот (N) | 1,2% |
| Органический азот (N) | 0,2% |
| Мочевинный азот (N) | 1% |
| Марганец (Mn), хелат EDTA | 0,5% |
| Цинк (Zn), хелат EDTA | 0,5% |
| Железо (Fe), хелат DTPA | 1% |
| pH (1% раствора) | 6 |

Применение

Применяется для развития корневой системы всех культур.

Листовая (некорневая) подкормка: 0,5-1 л/га (из расчета 100-250 л воды/га).

Фертигация (корневая подкормка): 4 л/га. Первую подкормку рекомендуется выполнять через неделю после высадки рассады, и далее 2-3 раза, с интервалом 7-10 дней. В период завязывания плодов повторить курс обработки. При прямом посеве культур препарат может быть применен на стадии появления 2-3 листьев.



Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Stimax Growth (Стимакс Рост)

БИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИСТОВОГО АППАРАТА

СТИМАКС РОСТ действует в качестве активатора роста. Предназначен для применения после стрессовых периодов и «гербицидной ямы». При наступлении благоприятных условий способствует быстрому формированию биомассы растения.



Состав

| | |
|---|--------|
| Экстракт водорослей Ascophyllum nodosum | 5% |
| Общий азот (N) | 8,3% |
| Нитратный азот (N) | 8,3% |
| Водорастворимый фосфор (P2O5) | 8,3% |
| Водорастворимый калий (K2O) | 8,3% |
| Железо (Fe), хелат EDTA | 0,03% |
| Марганец (Mn) | 0,02% |
| Молибден (Mo) | 0,001% |
| Марганец (Mn), хелат EDTA | 0,02% |
| Бор (B) | 0,03% |
| Цинк (Zn) | 0,01% |
| Медь (Cu) | 0,02% |
| Цинк (Zn), хелат EDTA | 0,01% |
| Медь (Cu), хелат EDTA | 0,02% |
| Железо (Fe) | 0,03% |

Применение

Листовая (некорневая) подкормка:

- Полевые культуры: 1-1,5 л/га, с интервалом 7-10 дней
- Плодовоовощные культуры: 2-3 л/га или 0,2-0,3 л/100 л рабочего раствора.

Фертигация (корневая подкормка):

4-5 л/га, с интервалом 7-10 дней.



Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Stimax Yield (Стимакс Урожай)

СТИМУЛИРУЕТ БЫСТРЫЙ РОСТ ПЛОДОВ ПЛОДООВОЩНЫХ КУЛЬТУР С КОРОТКИМ ЦИКЛОМ ВЕГЕТАЦИИ

СТИМАКС УРОЖАЙ — разработан специально для стимулирования быстрого укрупнения плодов плодоовощных культур, а также стимуляции налива у зерновых культур. Содержит сбалансированный набор макро- и микроэлементов.



Состав

| | |
|---|---------|
| Экстракт водорослей Ascophyllum nodosum | 12% |
| Свободные аминокислоты | 6% |
| Общий азот (N) | 6% |
| Мочевинный азот (N) | 3,8% |
| Органический азот (N) | 2,2% |
| Водорастворимый фосфор (P2O5) | 4% |
| Водорастворимый калий (K2O) | 5% |
| Железо (Fe), хелат DTPA | 0,5% |
| Марганец (Mn), хелат EDTA | 0,5% |
| Цинк (Zn), хелат EDTA | 0,5% |
| рН (1% раствора) | 5,8 |

Применение

Листовая (некорневая) подкормка:
0,5-1 л/га, с интервалом 7-10 дней
(0,2-0,3 л/100 л воды).

Фертигация (корневая подкормка):
3-5 л/га, с интервалом 8-10 дней.



Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Stimax Plus (Стимакс Плюс)

ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЦВЕТЕНИЯ И ЗАВЯЗЫВАНИЯ ПЛОДОВ ВСЕХ КУЛЬТУР

СТИМАКС ПЛЮС — предназначен для стимуляции закладки плодов всех сельскохозяйственных культур. Улучшает качество плодов, равномерность окраски, содержание сахара и белков, а также вкусовые качества и лежкость. При применении на зерновых культурах позволяет сократить длину междуузлий.



Состав

| | |
|---|-------|
| Экстракт водорослей Ascophyllum nodosum | 10% |
| Свободные аминокислоты | 4% |
| Общий азот (N) | 2% |
| Мочевинный азот (N) | 0,6% |
| Органический азот (N) | 1,4% |
| Водорастворимый фосфор (P2O5) | 8% |
| Водорастворимый калий (K2O) | 7% |
| Бор (B) | 0,15% |
| Молибден (Mo) | 0,15% |
| рН (1% раствора) | 6 |

Применение

Листовая (некорневая) подкормка:
0,03-0,05 л/га (30-50 мл/100 л воды),
с интервалом 7-10 дней.

Фертигация (корневая подкормка):
2 л/га.



Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Stimax Universal (Стимакс Универсал)

БИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗВИТИЯ

СТИМАКС УНИВЕРСАЛ помогает растениям в преодолении стрессовых ситуаций, вызванных засухой, переувлажнением, обработкой пестицидами и т.д. Применение препарата заметно увеличивает урожайность и улучшает общее состояние растений. Может применяться на любой стадии развития растений.



Состав

Экстракт водорослей Ascophyllum nodosum

15%

Общий азот (N)

5,6%

Мочевинный азот (N)

5%

Органический азот (N)

0,6%

Магний (MgO), хелат EDTA

0,2%

Железо (Fe), хелат DTPA

1%

Марганец (Mn), хелат EDTA

0,5%

Цинк (Zn), хелат EDTA

0,5%

pH (1% раствора)

6



Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Применение

Листовая (некорневая) подкормка:

- Для всех сельскохозяйственных культур: 0,5-1 л/га.
- Овощи: 0,15-0,2 л/100 л воды, повторная обработка каждые 15 дней.
- Арбуз, дыня и перец: 0,2 л/100 л воды, 3 обработки с интервалом 15 дней.
- Картофель: 0,1-0,15 л/100 л воды, 3 обработки с интервалом 15 дней.
- Лук: 200 мл/100 л воды, 3 обработки с интервалом 15 дней.
- Плодовые: 0,15-0,2 л/100 л воды, применение на этапах опадания лепестков, завязывания и укрупнения плодов.

Stimax Color (Стимакс Колор)

НОВЫЙ БИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ И ОКРАШИВАНИЯ ПЛОДОВ



СТИМАКС КОЛОР способствует созреванию и окрашиванию плодов, особенно плодов интенсивных цветов, которые из-за природно-климатических условий имеют трудности в обретении оптимального цвета.

Состав

Водорастворимый фосфор (P2O5)

6,5%

Водорастворимый калий (K2O)

31%

Водорастворимый кальций (CaO)

3%

Водорастворимое железо (Fe)

0,1%

Хелат железа EDDHA

0,1%

Водорастворимый молибден (Mo)

0,05%

pH (1% раствора)

7,5



Применение

Листовая (некорневая) подкормка:

- Овощи: 200-400 г/100 л воды. 2-3 внесения каждые 7-10 дней, начиная с момента достижения плода 80% окончательного размера.
- Плодовые: 300-400 г/100 л воды. 2-3 внесения. Первое внесение осуществляется при первичном изменении цвета плода. Повторно через 7-10 дней.
- Виноградники: 300-400 г/100 л воды. 2-3 внесения. Первое внесение осуществляется перед началом созревания винограда. Повторно через 7-10 дней.

Упаковка

1 кг | 3 кг

Антистрессанты AMINOMAX (АМИНОМАКС)

На сегодняшний день неустойчивый климат является одним из главных внешних лимитирующих факторов развития растений.

АМИНОМАКС — жидкое органоминеральное удобрение, содержащее аминокислоты с добавлением макро- и микроэлементов. Способствует быстрому восстановлению растений после стрессовых факторов, таких как: засуха, механические повреждения, обработка пестицидами, переувлажненность, остановка роста, засыхание нижних листьев.



Aminomax 10 (Аминомакс 10)

ЖИДКИЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ АМИНОКИСЛОТ



АМИНОМАКС 10 — жидккая аминокислотная формула для листовой подкормки и фертигации. Содержит наиболее полноценный состав аминокислот. Рекомендуется для универсального использования для всех культур.

Состав

| | |
|------------------------|------|
| Общий азот (N) | 3,2% |
| Органический азот (N) | 3,2% |
| Свободные аминокислоты | 10% |
| pH (1% раствора) | 4,1 |

Применение

Применяется для листовой (некорневой) подкормки всех сельскохозяйственных культур, на всех стадиях вегетационного периода: после пересадки, в начале вегетации, во время цветения и роста плодов.

Листовая (некорневая) подкормка:

1 л/га (0,2-0,3 л/100 л воды). При необходимости обработка повторяется через 7-10 дней.

Фертигация (корневая подкормка):

3-4 л/га.



Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Aminomax 30 (Аминомакс 30)

ЖИДКИЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ АМИНОКИСЛОТ

АМИНОМАКС 30 — жидккая аминокислотная формула для листовой (некорневой) подкормки, фертигации и капельного полива закрытого грунта с высоким процентным содержанием аминокислот. Способствует быстрому росту растения и быстрому восстановлению после стрессовых условий.

Состав

| | |
|------------------------|-----|
| Общий азот (N) | 9% |
| Органический азот (N) | 9% |
| Свободные аминокислоты | 30% |
| pH (1% раствора) | 4,1 |

Применение

Листовая (некорневая) подкормка:
0,5 л/га (0,1-0,2 л/100 л воды). При необходимости обработка повторяется через 7-10 дней.

Фертигация (корневая подкормка):

1,5 л/га.



Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Aminomax Organic (Аминомакс Органик)

АМИНОКИСЛОТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Сбалансированная формула доставляет растению необходимые аминокислоты,
что способствует увеличению плодородности и улучшению качества урожая.



Состав

| | |
|---------------------------------------|------|
| Свободные аминокислоты | 6,6% |
| Общее количество органических веществ | 30% |
| Общий азот (N) | 3,1% |
| Аммонийный азот (N) | 0,3% |
| Мочевинный азот (N) | 0,7% |
| Органический азот (N) | 1,9% |
| Нитратный азот (N) | 0,2% |

pH (1% раствора)

6



Применение

Листовая (некорневая) подкормка:

1 л/га (0,2-0,3 л/100 л воды).

Фертигация (корневая подкормка):

5-10 л/га.



Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Aminomax Vegetables (Аминомакс Овощной)

ЖИДКИЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ ФУЛЬВО- И АМИНОКИСЛОТ

АМИНОМАКС ОВОЩНОЙ представляет собой фульво- и аминокислотную жидкую формулу для корневой подкормки. Продукт выступает в качестве биостимулятора, а также выполняет функцию структурообразователя почвы. Снижает солевой стресс, вызванный неблагоприятным pH почвы и её засолением. Идеально для капельного полива.

Состав

| | |
|-------------------------|-----|
| Общий азот (N) | 2% |
| Органический азот (N) | 2% |
| Свободные аминокислоты | 6% |
| Общий гумусный экстракт | 20% |
| Фульвокислоты | 20% |

pH (1% раствора)

4,5

Применение

Фертигация (корневая подкормка): 3-6 л/га.

- Для открытого грунта: 5-7 л/га в рамках одной обработки. Рекомендуется 4 обработки в течение всего цикла развития культуры.



Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Aminomax Calcium (Аминомакс Кальций)

ЖИДКИЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ АМИНОКИСЛОТ И КАЛЬЦИЯ

АМИНОМАКС КАЛЬЦИЙ — жидккая аминокислотная формула, обогащенная кальцием.

Рекомендуется для всех культур с повышенным требованием к кальцию в фазе активного роста.

Состав

| | |
|-------------------------------|-------|
| Свободные аминокислоты | 12,5% |
| Общий азот (N) | 11% |
| Нитратный азот (N) | 3,1% |
| Мочевинный азот(N) | 3,3% |
| Органический азот (N) | 4,6% |
| Водорастворимый кальций (CaO) | 5,7% |
| pH (1% раствора) | 4 |

Применение

| |
|--|
| Рекомендуется для листовой (некорневой) подкормки для всех сельскохозяйственных культур. |
| Листовая (некорневая) подкормка: |
| 1-3 л/га (0,2-0,3 л/100 л воды). |
| Расход рабочего раствора 200-1000 л/га. |



Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Aminomax Sodam (Аминомакс Содам)

ЖИДКИЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ L-АМИНОКИСЛОТ

АМИНОМАКС СОДАМ - жидккая L-аминокислотная формула для корневой подкормки.

Питательные элементы быстро впитываются корневой системой и хорошо усваиваются самим растением. Продукт рекомендован к применению в периоды активного развития растения и в периоды действия неблагоприятных факторов окружающей среды.

Состав

| | |
|-----------------------|------|
| L-аминокислоты | 10% |
| Общий азот (N) | 6% |
| Органический азот (N) | 2,5% |
| Мочевинный азот (N) | 3,5% |
| Органические вещества | 20% |
| pH (1% раствора) | 4,6 |

Применение

| |
|---|
| Фертигация (корневая подкормка): |
| • Плодовые культуры: 60-80 л/га |
| • Овощные культуры: 60-75 л/га |
| Листовая (некорневая) подкормка: |
| • Плодовые культуры: 40-50 л/га в течении всего урожайного периода. |
| • Овощные культуры: 50-80 л/га |



Упаковка


0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Корректоры дефицита элементов питания MERISTEM (МЕРИСТЕМ)

Корректоры дефицита элементов питания, разработанные для листовых и корневых подкормок, содержащие макро- и микроэлементы, органические вещества и аминокислоты.

МЕРИСТЕМ — линия тщательно подобранных жидкких удобрений, предназначенных для компенсации дефицита отдельных элементов питания, таких как: калий, кальций, бор и молибден.





Meristem K (Меристем К)

КОРРЕКТОР ДЕФИЦИТА КАЛИЯ

МЕРИСТЕМ К — жидкое удобрение с высоким содержанием калия в форме карбоната.

Применяется в период созревания плодов, налива зерна, улучшает цвет, содержание сахара и масла, и их накопление в запасающих органах.

Состав

| | |
|-----------------------------|-----|
| Общий азот (N) | 3% |
| Мочевинный азот(N) | 3% |
| Водорастворимый калий (K2O) | 31% |
| pH (1% раствора) | 14 |

Применение

Листовая (некорневая) подкормка:

0,4-0,5 л/100 л воды, с интервалом 7-10 дней.

- Сады: 0,2 л/100 л воды, с интервалом 10-15 дней.

Фертигация (корневая подкормка):

7-15 л/га, с интервалом 10-15 дней.


- Сады: 5-10 л/га по мере необходимости.

Рекомендуется для листовых подкормок всех культур, предъявляющих повышенные требования к калию в периоды налива и созревания.



Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л



Meristem B (Меристем Б)

КОРРЕКТОР ДЕФИЦИТА БОРА

МЕРИСТЕМ Б — удобрение, применяемое для компенсации дефицита бора.

Состав

| | |
|------------------|-----|
| Бор (B) | 11% |
| pH (1% раствора) | 6 |

Применение

Листовая (некорневая) подкормка:

- Овощные, полевые и технические культуры: 0,3-0,4 л/100 л воды (0,3-1 л/га), с интервалом 7-10 дней.
- Сады: 0,15-0,2 л/100 л воды в фазы: перед цветением, закладки плодов - послеуборочный период.

Фертигация (корневая подкормка):

3-5 л/га.




Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Meristem Ca (Меристем Са)

КОРРЕКТОР ДЕФИЦИТА КАЛЬЦИЯ



МЕРИСТЕМ Са — продукт на основе кальция, предотвращает или восполняет недостаток кальция в сельскохозяйственных культурах. Содержит аминокислоты, которые усиливают поглощение кальция.

Состав

| | |
|-------------------------------|------|
| Общий азот (N) | 9,7% |
| Нитратный азот (N) | 9% |
| Органический азот (N) | 0,7% |
| Водорастворимый кальций (CaO) | 17% |
| Свободные аминокислоты | 2% |
| pH (1% раствора) | 2,5 |

Применение

- Листовая (некорневая) подкормка:**
0,2-0,5 л/100 л воды, с интервалом 7-10 дней в фазы завязывания и развития плода.
- Фертигация (корневая подкормка):**
- Овощные культуры: 10 л/га, с интервалом 7-10 дней.
 - Сады: 5 л/га в неделю




Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Meristem Ca-B (Меристем Са-В)

КОРРЕКТОР ДЕФИЦИТА КАЛЬЦИЯ И БОРА



Состав

| | |
|-------------------------------|----|
| Водорастворимый кальций (CaO) | 7% |
| Бор (B) | 1% |
| pH (1% раствора) | 5 |

Кальций образует комплекс с глюкогептонатами, а бор представлен в форме этаноламина бора.

Применение

- Листовая (некорневая) подкормка:**
- Овощные культуры: 0,3-0,4 л/100 л воды, с интервалом 10 дней в фазы: перед цветением и рост плодов.
 - Сады: 0,2-0,4/100 л воды, с интервалом 15 дней в фазы: начало вегетации, перед цветением, рост плодов.
- Фертигация (корневая подкормка):**
- 3-5 л/га по мере необходимости.




Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Meristem B-Mo (Меристем В-Мо)

КОРРЕКТОР ДЕФИЦИТА БОРА И МОЛИБДЕНА

МЕРИСТЕМ В-Мо — продукт для компенсации дефицита бора и молибдена, применяемый в форме листовой и корневой подкормки.



Состав

| | |
|------------------|----|
| Бор (B) | 4% |
| Молибден (Mo) | 4% |
| pH (1% раствора) | 9 |

Применение

Применяется перед цветением, при завязывании и для укрупнения плодов.

Листовая (некорневая) подкормка:

0,25-0,3 л/100 л воды, с интервалом 10-15 дней.

Фертигация (корневая подкормка):

2-3 л/га, 3-4 обработки, с интервалом 10-15 дней.



Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Meristem Mix (Меристем Микс)

КОРРЕКТОР ДЕФИЦИТА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПОЧВЫ

МЕРИСТЕМ Микс — жидкая подкормка с микроэлементами для почвы.

Предотвращает или восполняет недостаток железа, марганца, цинка, меди, бора и молибдена.

Состав

| | |
|-------------------------------|-------|
| Водорастворимый бор (B) | 0,20% |
| Водорастворимая медь (Cu) | 0,20% |
| Медь (Cu), хелат DTPA | 0,20% |
| Водорастворимое железо (Fe) | 3,30% |
| Железо (Fe), хелат DTPA | 3,30% |
| Водорастворимый марганец (Mn) | 1,50% |
| Марганец (Mn), хелат DTPA | 1,50% |
| Водорастворимый молибден (Mo) | 0,02% |
| Водорастворимый цинк (Zn) | 0,40% |
| Цинк (Zn), хелат DTPA | 0,40% |
| pH (1% раствора) | 4 |

Применение

Фертигация (корневая подкормка):

0,004-0,005 л/100 л воды с интервалом 8-10 дней в течении вегетационного периода.



Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 20 л

Корректоры дефицита элементов питания

MERISTEM MICRO (МЕРИСТЕМ МИКРО)

Сухие водорастворимые микроэлементы с максимальной концентрацией.
Могут использоваться во всех видах систем капельного орошения и при листовых
(некорневых) подкормках. Повышают качество плодов, улучшая их вызревание.
Повышают сопротивляемость вредителям и болезням.



| Продукт | Характеристики | Состав | Применение |
|---|---|--|--|
|  | MERISTEM MICRO Fe (МЕРИСТЕМ МИКРО Fe) Хелат железа рекомендуется для коррекции и профилактики дефицита железа в любой культуре, в нейтральных или умеренно кислых почвах. Интервал pH стабильности: 4-7 | Железо (Fe) (EDDHA): 13% pH (1% раствора): 4,5 | |
|  | MERISTEM MICRO Fe (МЕРИСТЕМ МИКРО Fe) Интервал pH стабильности: 3-12 | Железо (Fe) (EDDHA): 6% (4,8% ortho-ortho); Железо (Fe) (EDDHA): 6% (4% ortho-ortho); | Фертигация (корневая подкормка): 2-4 кг/га Овощи: Применять перед посевом. Плодовые: Применять |
|  | MERISTEM MICRO Zn (МЕРИСТЕМ МИКРО Zn) Хелат цинка рекомендуется для коррекции и профилактики дефицита цинка в любой культуре. Интервал pH стабильности: 3,5-11 | Цинк (Zn) (EDTA): 14% pH (1% раствора): 6,5 | Листовая (некорневая подкормка): 50-100 г/100 л воды. Применять в начале весны. |
|  | MERISTEM MICRO Mn (МЕРИСТЕМ МИКРО Mn) Хелат марганца рекомендуется для коррекции и профилактики дефицита марганца в любой культуре. Интервал pH стабильности: 3,5-11 | Марганец (Mn) (EDTA): 13% pH (1% раствора): 6,5 | |
|  | MERISTEM MICRO Mg (МЕРИСТЕМ МИКРО Mg) Хелат магния рекомендуется для коррекции и профилактики дефицита магния в любой культуре. Интервал pH стабильности: 3,5-11 | Магний (Mg) (EDTA): 10% pH (1% раствора): 6,5 | Фертигация (корневая подкормка): 2-6 кг/га. Овощи: Перед посевом. Плодовые: В первую фазу вегетативного развития. В зависимости от размера дерева: 20-100 г/дерево. Листовая (некорневая подкормка): 50-100 г/100 л воды. Перед вегетативным развитием. В случае хлороза, обработку повторить через 3 недели. |
|  | MERISTEM MICRO B-Mo (МЕРИСТЕМ МИКРО B-Mo) Разработан для компенсации дефицита бора и молибдена. Вносится путем фертигации и листовой подкормки. Стимулирует процесс цветения и урожайности. В результате действия продукта пыльца появляется раньше, и обеспечивается более высокая жизнеспособность цветков. | Бор (B): 8% Молибден (Mo): 10% pH (1% раствора): 7,8 | Для листовой подкормки и фертигации любой плодовоовощной культуры для стимулирования цветения (дыня, арбуз). Рекомендован для выращивания плодовоовощных культур в теплицах в рамках комплексной программы борьбы с вредителями. Фертигация: 2,5-3 кг/га. Концентрация рабочего раствора: 0,25-0,3%. Листовая подкормка: 250-300 г/100 л воды. |

Упаковка
1 кг | 5 кг | 20 кг

Meristem Micro B (Меристем Микро Бор)

КОРРЕКТОР ДЕФИЦИТА БОРА

Высококонцентрированный продукт, содержащий 21% бора, используется для профилактики и коррекции дефицита бора для любых культур. Особенno эффективен для масличных культур и сахарной свеклы.

Состав

Бор (B) 21%

pH (1% раствора) 7,6

Упаковка

1 кг | 5 кг | 20 кг



Применение

Листовая (некорневая) подкормка:

- Подсолнечник, рапс: 0,5-0,75 кг/га
- Сады: 0,1-0,2 кг/100 л рабочего раствора
- Овощные культуры: 0,1-0,2 кг/100 л рабочего раствора
- Сахарная свекла: 0,5-0,75 кг/га
- Картофель: 0,5-1 кг/га

Продукт совместим с большинством удобрений.

Не смешивать с кальцием, магнием, железом и цинком, если только они не хелатированы.

Фертигация (корневая подкормка):

- Овощные культуры: 5-10 кг/га
- Сады: 50-100 г/дерево



Meristem Micro Mix (Меристем Микро Микс)

КОРРЕКТОР ДЕФИЦИТА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Комплекс хелатированных микроэлементов рекомендован для предотвращения или устранения недостатков растений, вызванных дефицитом железа, марганца, цинка, меди, бора и молибдена. Рекомендуется для гидропоники и фертигации.

Состав

| | |
|---------------------------|-------|
| Железо (Fe), хелат EDTA | 7,5% |
| Марганец (Mn), хелат EDTA | 3,5% |
| Цинк (Zn), хелат EDTA | 0,7% |
| Медь (Cu), хелат EDTA | 0,28% |
| Бор (B) | 0,65% |
| Молибден (Mo) | 0,3% |
| pH (1% раствора) | 3,3 |

Упаковка

1 кг | 5 кг | 20 кг



Применение

Гидропоника:

3-6 г / 100 л воды

Фертигация:

- Плодовые культуры:

2-3 кг / га

- Овощные культуры: 1,5-2 кг / га

Рекомендуется выполнять 3-4 обработки с указанной нормой внесения при крайней необходимости.



Водорастворимые микроудобрения

для листовых подкормок

MERISTEM MAX (МЕРИСТЕМ МАКС)

Высококачественные водорастворимые микроудобрения с идеальным сочетанием макро и микроэлементов. Улучшают проникновение активных ингредиентов в растение, ускоряют транспортировку питательных элементов, поглощение через клеточную мембрану и стимулируют обмен веществ в растении. Комплекс AFA в составе продуктов специально разработан для эффективного применения листовой подкормки.



| Продукт | Характеристики | Состав | Применение |
|--|---|---|---|
| MERISTEM MAX 18-18-18 (МЕРИСТЕМ МАКС 18-18-18)  | Рекомендован для зерновых культур. Способствует увеличению урожайности и улучшению качества зерна. | Общий азот (N): 18% Аммиачный азот (N): 3,56% Мочевинный азот (N): 14,44% Фосфор (P2O5): 18% Калий (K2O): 18% Магний (MgO): 2% Железо (Fe): 0,06% Цинк (Zn): 0,02% Марганец (Mn): 0,02% Медь (Cu): 0,02% Бор (B): 0,01% Молибден (Mo): 0,001% рН (1% раствора): 5,4 | Листовая (некорневая) подкормка: Применяется в два этапа: 1 этап - фаза кущения: 2-3 кг/га. 2 этап - применяется в фазы удлиненного листа до фазы цветения: 2-3 кг/га. |
| MERISTEM MAX 19-19-19 (МЕРИСТЕМ МАКС 19-19-19) БЕСХЛОРНЫЙ  | Рекомендован для кукурузы. Способствует увеличению урожайности. Стимулирует рост культуры и обеспечивает питательными элементами. Сокращает последствия стресса после града, заморозков, ветра и применения гербицидов. | Общий азот (N): 19% Аммиачный азот (N): 1,8% Мочевинный азот (N): 17,2% Фосфор (P2O5): 19% Калий (K2O): 19% Магний (MgO): 3% Железо (Fe): 0,06% Цинк (Zn): 0,02% Марганец (Mn): 0,02% Медь (Cu): 0,02% Бор (B): 0,01% Молибден (Mo): 0,001% рН (1% раствора): 6,8 | Листовая (некорневая) подкормка: Применяется в два этапа: 1 этап - распускание 3-6 листьев: 2-3 кг/га. 2 этап - распускание 7-9 листьев: 2-3 кг/га. |
| MERISTEM MAX 0-21-34 (МЕРИСТЕМ МАКС 0-21-34)  | Рекомендован для масличных культур. Высокое содержание бора, что увеличивает количество масла в растении. Повышает выработку пыльцы. | Фосфор (P2O5): 21% Калий (K2O): 34% Магний (MgO): 1% Бор (B): 1,45% Цинк (Zn): 0,15% Марганец (Mn): 0,15% Молибден (Mo): 0,002% рН (1% раствора): 3,35 | Листовая (некорневая) подкормка: Рапс: 2-3 кг/га Подсолнечник: применение на этапе появления 4-8 листьев: 3-4 кг/га. Соя: - Этап появления 3-5 листьев: 2 кг/га; - Этап появления 5-6 листьев до начала цветения: 2 кг/га. - Перед фазой созревания: 2 кг/га |
| MERISTEM MAX 0-43-28 (МЕРИСТЕМ МАКС 0-43-28)  | Рекомендован для картофеля и сахарной свеклы. Способствует улучшенной впитываемости активных ингредиентов и стимулирует обмен веществ в растении. | Фосфор (P2O5): 43% Калий (K2O): 28% Магний (MgO): 2% Бор (B): 0,50% Железо (Fe): 0,06% Цинк (Zn): 0,02% Марганец (Mn): 0,02% Медь (Cu): 0,02% Молибден (Mo): 0,001% рН (1% раствора): 3,88 | Листовая (некорневая) подкормка: Сахарная свекла: 1 этап - за 60 дней до сбора урожая: 3 кг/га. 2 этап - за 30 дней до сбора урожая: 3 кг/га. Картофель: 1 этап - 50 - 90 дней после высадки: 2 кг/га. 2 этап - от завязывания клубней - до полного клубнеобразования. |

Упаковка
10 кг | 25 кг

Водорастворимые микроудобрения для капельных систем MERISTEM DRIP (МЕРИСТЕМ ДРИП)

Водорастворимые микроудобрения МЕРИСТЕМ ДРИП применяются в критические фазы развития растений, когда нехватка элементов питания может привести к значительному снижению урожайности и качества продукции. Микроудобрения МЕРИСТЕМ ДРИП обогащены специальными ризобактериями и органическими веществами, способствующими быстрому формированию и созреванию плодов.



Meristem Drip Fast Ripening (Фаст Райпенинг)

ВОДОРАСТВОРИМОЕ УДОБРЕНИЕ, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ СОЗРЕВАНИЮ ПЛОДОВ

МЕРИСТЕМ ФАСТ РАЙПЕНИНГ — некорневая подкормка, применяется для развития растений в периоды формирования и созревания плодов, когда растение испытывает особый недостаток калия. Рекомендуется для плодовых и плодовоовощных культур.

Состав

| | |
|-----------------------------|-----|
| Общий азот (N) | 3% |
| Нитратный азот (N) | 3% |
| Водорастворимый калий (K2O) | 46% |

Применение

| | |
|----------------------------------|--|
| Листовая (некорневая) подкормка: | 200-250 г/100 л. |
| Фертигация: | 15-20 кг/га. Рекомендуется 2-3 применения на поздних стадиях развития растений. |
| Капельный полив: | 0,5-2 г/1 литр воды, в зависимости от типа почвы и культуры. Концентрация: 10 кг/100 л воды. |



Упаковка

10 кг | 25 кг

Meristem Drip Spring (Весна)

ВОДОРАСТВОРИМОЕ УДОБРЕНИЕ, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ СОЗРЕВАНИЮ РАСТЕНИЙ

МЕРИСТЕМ ВЕСНА — применяется на плодовых культурах для стимуляции перед цветением, а также для развития плода. Продукт совместим с инсектицидами и фунгицидами, за исключением щелочных.

Состав

| | |
|-------------------------------|--------|
| Общий азот (N) | 20% |
| Нитратный азот (N) | 1% |
| Аммонийный азот (N) | 6% |
| Мочевинный азот (N) | 13% |
| Водорастворимый фосфор (P2O5) | 15% |
| Водорастворимый калий (K2O) | 10% |
| Водорастворимый магний (MgO) | 2% |
| Бор (B) | 0,02% |
| Марганец (Mn) | 0,15% |
| Молибден (Mo) | 0,002% |
| Цинк (Zn) | 0,15% |
| pH (1% раствора) | 5 |

Применение

| | |
|---|--|
| Листовая (некорневая) подкормка: | |
| Рекомендуется начать применение весной и далее использовать совместно со стандартными обработками. Рекомендуется обильно поливать растение с нормой расхода 300-500 г/100 л воды. | |
| Период применения: начиная с весны до сбора урожая. | |



Упаковка

10 кг | 25 кг

Meristem Drip Christaphos (Кристафоз)

ВОДОРАСТВОРИМОЕ НРК УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ РИЗОБАКТЕРИЙ

МЕРИСТЕМ КРИСТАФОЗ — продукт с высоким содержанием фосфора, азота и калия, дополненный органическими веществами с ризобактериями, стимулирующими рост и развитие корневой системы. Продукт способствует улучшению физико-химических свойств почвы, развитию корневой системы, цветению и формированию плодов.

Состав

| | |
|-------------------------------|-----|
| Общий азот (N) | 11% |
| Аммонийный азот (N) | 11% |
| Водорастворимый фосфор (P2O5) | 30% |
| Водорастворимый калий (P2O) | 11% |
| Фульвовые кислоты | 2% |
| pH (1% раствора) | 3,5 |

Применение

Рекомендуется для капельного полива при посеве и после, в период, когда растение испытывает высокую потребность в фосфоре.
Норма расхода: 30-50 кг/га.
Рекомендуется 2-3 применения с интервалом 7-14 дней.
Предупреждение: не смешивать с щелочными и кальций-содержащими продуктами.



Упаковка

10 кг | 25 кг

Meristem Drip Nitromax (Нитромакс)

ВОДОРАСТВОРИМОЕ УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ВЕЩЕСТВ

МЕРИСТЕМ НИТРОМАКС - продукт, разработанный специально для применения в период созревания растений, обеспечивает полное обогащение азотом и калием. Содержит органический комплекс веществ, способствующих быстрому поглощению растением удобрения.

Состав

| | |
|-------------------------------|--------|
| Общий азот (N) | 11% |
| Нитратный азот (N) | 7,5% |
| Аммонийный азот (N) | 3,5% |
| Водорастворимый калий (K2O) | 40% |
| Водорастворимый марганец (Mn) | 0,15% |
| Водорастворимый цинк (Zn) | 0,15% |
| Водорастворимый бор (B) | 0,02% |
| Водорастворимый молибден (Mo) | 0,002% |
| Свободные аминокислоты | 0,12% |

pH (10% раствора) 7,25

Применение

Применяется для всех сельскохозяйственных культур.
Листовая (некорневая) подкормка:
250-500 г/100 л воды.
Капельный полив: 0,5-2 г/1 л воды, в зависимости от типа почвы и культуры.




Упаковка

10 кг | 25 кг

Водорастворимые микроудобрения для капельных систем Меристем Дрип

| Упаковка 10 кг 25 кг | Общее кол-во Азота (N) | Водорастворимый пентоксид фосфора (P2O5) | Водорастворимый оксид калия (K2O) | +Микроэлементы (ME) |
|----------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| MERISTEM 8-4-42+2MGO+MIX | 8 | 4 | 42 | +2MgO+0,02B+0,15Mn+0,002Mo+0,15Zn |
| MERISTEM 11-40-11+2MGO+MIX | 11 | 40 | 11 | +2MgO+0,02B+0,15Mn+0,002Mo+0,15Zn |
| MERISTEM 17-6-6+2MGO+MIX | 17 | 6 | 6 | +2MgO+0,02B+0,15Mn+0,002Mo+0,15Zn |
| MERISTEM 20-20-20+MIX | 20 | 20 | 20 | +0,02B+0,15Mn+0,002Mo+0,15Zn |
| MERISTEM 14-15-16+2MGO+MIX | 14 | 15 | 16 | +2MgO+0,02B+0,15Mn+0,002Mo+0,15Zn |
| MERISTEM 13-5-30+2MGO+MIX | 13 | 5 | 30 | +2MgO+0,02B+0,15Mn+0,002Mo+0,15Zn |
| MERISTEM 20-5-20+2MGO+MIX | 20 | 5 | 20 | +2MgO+0,02B+0,15Mn+0,002Mo+0,15Zn |
| MERISTEM 20-5-10+2MGO+MIX | 20 | 5 | 10 | +2MgO+0,02B+0,15Mn+0,002Mo+0,15Zn |
| MERISTEM 14-12-28+MIX | 14 | 12 | 28 | +0,02B+0,15Mn+0,002Mo+0,15Zn |
| MERISTEM 16-7-28+MIX | 16 | 7 | 28 | +0,02B+0,15Mn+0,002Mo+0,15Zn |
| MERISTEM 8-16-24+2MGO+MIX | 8 | 16 | 24 | +2MgO+0,02B+0,15Mn+0,002Mo+0,15Zn |
| MERISTEM 23-5-14+2MGO+MIX | 23 | 5 | 14 | +2MgO+0,02B+0,15Mn+0,002Mo+0,15Zn |
| MERISTEM 18-18-18+MIX | 18 | 18 | 18 | +0,02B+0,15Mn+0,002Mo+0,15Zn |
| NITROEXPRESS 22-0-8+12CAO | 22 | 0 | 8 | +12CaO |



Полифлавоноиды ISTARKA (ИСТАРКА)

Уникальная линия удобрений для компенсации дефицита питательных веществ, которые содержат микроэлементы на основе лигносульфонатов в качестве хелатообразователей. Способствует легкому поступлению элементов питания в растение, избегая при этом проблем фитотоксичности. Специально предназначен для листовой (некорневой) подкормки. Ключевой особенностью этой линии удобрений является устойчивость к фотодеградации на поверхности листа растения при сохранении высокой эффективности.



Полифлавоноиды Istarka (Истарка)

| Продукт | Характеристики | Состав | Применение |
|----------------------------------|--|--|--|
| ISTARKA Fe (ИСТАРКА Fe) | Удобрение, компенсирующее дефицит железа | Железо (Fe): 5% | Листовая подкормка: 0,5-0,6 л/100 л воды |
| ISTARKA Zn (ИСТАРКА Zn) | Удобрение, компенсирующее дефицит цинка | Цинк (Zn): 10% | Листовая подкормка: 0,25-0,5 л/100 л воды |
| ISTARKA Mg (ИСТАРКА Mg) | Удобрение, компенсирующее дефицит магния | Магний (Mg): 6% | Листовая подкормка: 0,25-0,5 л/100 л воды |
| ISTARKA Mn (ИСТАРКА Mn) | Удобрение, компенсирующее дефицит марганца | Марганец (Mn): 7,5% | Листовая подкормка: 0,3-0,5 л/100 л воды |
| ISTARKA Ca (ИСТАРКА Ca) | Удобрение, компенсирующее дефицит кальция | Кальций (Ca): 5% | Листовая подкормка: 0,25-0,5 л/100 л воды |
| ISTARKA Zn-Mn (ИСТАРКА Zn-Mn) | Удобрение, компенсирующее дефицит цинка и марганца | Цинк (Zn): 3,5% Марганец (Mn): 3,5% | Листовая подкормка: 0,3-0,6 л/100 л воды |
| ISTARKA MIX (ИСТАРКА МИКС) | Многокомпонентный компенсатор дефицита микроэлементов, рекомендуемый для листовой подкормки. | Бор (B): 0,4% Медь (Cu): 0,25% Железо (Fe): 2% Марганец (Mn): 1% Молибден (Mo): 0,05% Цинк (Zn): 1% | Листовая подкормка: 0,2-0,4 л/100 л воды • Зерновые культуры: 0,5-1 л/га; • Плодовоовощные культуры: 2-3 л/га Фертигация: 3-5 л/га |

Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л



Фосфиты КАФОМ (КАФОМ)

Жидкое органо-минеральное удобрение, содержащее фосфор, калий и другие элементы. Обладает фунгицидным эффектом против фитофторы, милдью и других заболеваний группы оомицеты.

Фосфитные продукты хорошо растворяются в воде, легко усваиваются растениями через листовую поверхность и активизируют механизм самозащиты растений.



Фосфиты Kafom (Кафом)

| Продукт | Характеристики | Состав | Применение |
|--|--|--|---|
|  KAFOM K (КАФОМ К) | Продукт на основе фосфита калия | Фосфор (P2O5): 30% Калий (K2O): 20% | |
|  KAFOM Mg (КАФОМ Mg) | Продукт на основе фосфита магния | Фосфор (P2O5): 40% Магний (MgO): 10% | Листовая подкормка: 1-1,5 л/га с интервалом 7-10 дней. |
|  KAFOM Ca (КАФОМ Ca) | Продукт на основе фосфита калия и фосфита кальция | Фосфор (P2O5): 20% Калий (K2O): 5% Кальций (CaO): 5% | Рекомендуется 2-3 обработки. • Сады и виноградники: 0,15-0,3 л/100 л воды с интервалом 7-10 дней. |
|  KAFOM Cu (КАФОМ Cu) | Продукт на основе фосфита калия, обогащенный медью | Фосфор (P2O5): 15% Калий (K2O): 15% Медь (Cu): 1% | Фертигация: 3-5 л/га с интервалом 7-10 дней. |
|  KAFOM Zn (КАФОМ Zn) | Продукт на основе фосфита калия и фосфита цинка | Фосфор (P2O5): 30% Калий (K2O): 5% Цинк (Zn): 8,5% | |

Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л




MADRAM (МАДРАМ)

Жидкие продукты на основе гуминовых кислот МАДРАМ выступают в качестве корректоров засоленности натриевой и щелочной почв. Действие продуктов оказывает влияние как на почву, так и на само растение: способствует улучшению структуры почвы, высокой проницаемости воды в плотный грунт, водоудерживающей способности рыхлой почвы и сохранению в ней питательных элементов. МАДРАМ помогает в развитии корневой системы растений, в росте, повышает устойчивость к паразитам, а также перепадам температуры.



Madram Ca (Мадрам Са)

ЖИДКИЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ АМИНОКИСЛОТ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КОМПЛЕКСОВ КАЛЬЦИЯ И АЗОТА



МАДРАМ КАЛЬЦИЙ — устраняет избыточное содержание натрия, улучшает структуру почвы, жизненную активность микроорганизмов, подвижность питательных веществ, восполняет недостаток кальция, способствует развитию корневой системы.

Состав

| | |
|--|-------|
| Общий азот (N) | 4,7% |
| Нитратный азот (N) | 4% |
| Органический азот (N) | 0,7% |
| Водорастворимый калий (K2O) | 2,5% |
| Водорастворимый кальций (CaO) | 7,8% |
| Оксид кальция(CaO), образованный лигносульфонатами | 7,8% |
| Общее количество органического вещества | 12,5% |
| Общий экстракт гумуса | 9,5% |
| Фульвокислоты | 9,5% |
| pH (1% раствора) | 5,5 |

Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Применение

Фертигация: рекомендуется смешивать с водой для орошения: 40-80 л/га, в зависимости от содержания соли и натрия в почве.
Для почвы средней засоленности: 55-65 л/га.
Несовместимость: не смешивать с продуктами, образующими кислую среду, сульфатами, карбонатами, фосфатами и серой.



Madram Humus (Мадрам Гумус)

ЖИДКИЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ

МАДРАМ ГУМУС — способствует улучшению структуры почвы, удержанию в ней питательных элементов, высокой проницаемости плотного грунта и водоудерживающей способности рыхлого грунта. Повышает устойчивость растений к воздействию неблагоприятных факторов.

Состав

| | |
|-----------------------------|-----|
| Водорастворимый калий (K2O) | 5% |
| Общий экстракт гумуса (В) | 15% |
| Гуминовые кислоты | 12% |
| Фульвокислоты | 3% |
| pH (1% раствора) | 12 |

Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л

Применение

Подходит для всех видов растений, выращиваемых в открытом и закрытом грунте. Добавляется в локальную оросительную систему, распыливается или наносится на почву. Применяется в любое время года, предпочтительно весной и в первой половине цикла растений.
Корневая подкормка: 60-120 л/га, 2-3 раза, предпочтительно в начале культивации почвы.
Фертигация: 50-100 л/га, на весь цикл вегетации. Рекомендуется для еженедельного полива.



Madram Bio (Мадрам Био)

ЖИДКИЙ ПРОДУКТ, КОРРЕКТИРУЮЩИЙ СОДЕРЖАНИЕ СОЛИ И НАТРИЯ В ПОЧВЕ

В разных типах почвы МАДРАМ БИО действует с помощью катионной способности обмена.

Благодаря его составу с высоким содержанием фульвовой кислоты и органических веществ, продукт улучшает физические свойства почвы, микробиологический состав и поглощение питательных веществ.

Состав

Общее количество органического вещества

36%

Общий экстракт гумуса

36%

Общий азот (N)

2%

Водорастворимый калий (K2O)

13%

pH (1% раствора)

4

Применение

Для правильного применения продукта требуется точное определение типа почвы.

Листовая (некорневая) подкормка: рекомендуется 2-3 применения по 4,5 л/га.


Корневая подкормка: смешивается с ирригационной водой, 40-80 л/га, в зависимости от содержания соли и натрия в почве. Для почвы с повышенным содержанием натрия рекомендуется 55-65 л/га.



Упаковка

0,5 л | 1 л | 5 л | 25 л





Для заметок





Nutritech System

В новую пропоге

NUTRITECH SYSTEM

info@nutritechsys.biz
www.nutritechsys.com